



Impfung Kälberdurchfall

Mutterschutzimpfung gegen: Coronavirus, Rotavirus und E. coli

Einzel Dosen zu 2ml

Trächtige Rinder und Kühe werden im ersten Jahr zweimal geimpft (Injektion in Muskel):

- 1. Impfung: 6 bis 8 Wochen vor dem errechneten Abkalbetermin.
- 2. Impfung: 2 bis 3 Wochen vor dem errechneten Abkalbetermin.

Jährlich erneute Impfung zwei bis drei Wochen vor dem errechneten Abkalbetermin.

Neugeborenen Kälbern ist nach der Geburt so rasch wie möglich, auf alle Fälle aber innerhalb der ersten acht Stunden, Kolostrum zu verabreichen.

In den ersten 24 Stunden soll das Kalb insgesamt etwa 2 1/2 L Kolostrum verteilt auf mehrere Gaben erhalten.

Es wird angeraten, während wenigstens drei Tagen ausschliesslich Muttermilch zu verabreichen.

Impfung Lungenentzündung

Kälberimpfung gegen Bovines Respiratorisches Synzytialvirus (BRSV) und Bovines Parainfluenza 3 (PI3)-Virus

Einzel Dosen zu 2 ml oder Flasche à 5 Dosen

Kälbern ab einem Alter von 1 Woche wird mit Hilfe eines intranasalen Applikators eine 2 ml-Einzeldosis des Impfstoffs in die Nase verabreicht.

In seltenen Fällen (v.a. Grossviehmast) kann im Alter von 4 Monaten eine Weiterführung der Impfung Sinn machen:

Kälber, die vier Monate alt oder älter sind, erhalten 2 Impfdosen im Abstand von drei Wochen (Injektion in Muskel).